
Übungsaufgaben zur Vorlesung Analysis II

Blatt 2

Abgabe: Mo, 3.5.2010 bis 9:10 Uhr

Aufgabe 5.

Geben Sie eine Reihendarstellung der folgenden Funktion an (mit Beweis):

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \int_0^x \frac{\sin(t^2)}{t} dt \text{ falls } x \neq 0 \text{ und } f(0) = 0$$

Aufgabe 6.

$M(n \times n, \mathbb{R})$ bezeichne die Menge der $n \times n$ -Matrizen mit Koeffizienten in \mathbb{R} . Zeigen Sie, daß die Funktion

$$\exp : M(n \times n, \mathbb{R}) \longrightarrow M(n \times n, \mathbb{R}), \quad \exp(A) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n!}$$

differenzierbar ist bei der Nullmatrix mit Differential $d_0 \exp = \text{id}$.

Aufgabe 7.

Bestimmen Sie die Stellen, an denen die Funktion $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}, f(x) = |x|$ differenzierbar ist, und berechnen Sie an diesen Stellen den Gradienten. Hierbei bezeichne $|\cdot|$ die euklidische Norm auf \mathbb{R}^n . Fertigen Sie eine Skizze für den Fall $n = 2$ an.

Aufgabe 8.

Sei $\text{inv} : \text{GL}(n; \mathbb{R}) \rightarrow M(n \times n; \mathbb{R})$ das Invertieren von Matrizen, $\text{inv}(X) = X^{-1}$. Man zeige für das Differential des Invertierens bei der Einheitsmatrix I die Formel $d_I \text{inv} : H \mapsto -H$. Man zeige allgemeiner, daß das Differential dieser Abbildung am Punkt P in Verallgemeinerung der Ableitungsregel für $x \mapsto 1/x$ gegeben wird durch

$$\begin{aligned} d_P \text{inv} : M(n \times n; \mathbb{R}) &\rightarrow M(n \times n; \mathbb{R}) \\ H &\mapsto -P^{-1}HP^{-1} \end{aligned}$$

Hinweis: Man zeige zunächst, daß inv differenzierbar ist. Dann nehme man in der Gleichung $\text{inv}(X)X = I$ auf beiden Seiten das Differential an der Stelle P . Alternative: Man wähle eine Norm auf \mathbb{R}^n und die zugehörige Matrixnorm auf $M(n \times n; \mathbb{R})$ und beachte, daß für alle Matrizen H der Norm < 1 gilt $(I - H)(I + H + H^2 + H^3 \dots) = I$.