

**Aufgabe 1** *Metrische und induzierte Topologie.*

Sei  $(X, d)$  ein metrischer Raum, und  $\mathcal{O}_{(X,d)}$  die metrische Topologie auf  $X$  (siehe Definition 1.1 aus der Vorlesung). Sei  $M \subset X$ ,  $(M, \tilde{d})$  der induzierte metrische Raum,  $\tilde{d}(x, y) := d(x, y)$  für alle  $x, y \in M$ , und  $\mathcal{O}_{(M,\tilde{d})}$  die metrische Topologie auf  $M$ , die von  $(M, \tilde{d})$  kommt. Schließlich sei  $\mathcal{O}_M$  die induzierte Topologie (von  $\mathcal{O}_{(X,d)}$ ) auf  $M$ . Man Zeige:  $\mathcal{O}_M = \mathcal{O}_{(M,\tilde{d})}$ .

**Aufgabe 2** *Stetigkeit und die Quotienttopologie*

Seien  $X, Y$  topologische Räume, und  $\sim$  eine Äquivalenzrelation auf  $X$ . Sei  $[z] := \{w \in X : w \sim z\}$  die Äquivalenzklasse von  $z$ ,  $X/\sim := \{[z] : z \in X\}$  die Menge der Äquivalenzklassen und  $\pi : X \rightarrow X/\sim, z \rightarrow [z]$  die kanonische Projektion, und sei  $X/\sim$  mit der Quotienttopologie versehen. Sei  $f : X \rightarrow Y$  eine Abbildung mit  $f(x) = f(y)$  für alle  $x, y$  mit  $x \sim y$  (also,  $f$  ist konstant auf jeder Fasser). Zeigen Sie:

1.  $\tilde{f} : X/\sim \rightarrow Y$  durch  $\tilde{f}([x]) = f(x)$  ist wohldefiniert.
2.  $f$  ist stetig  $\iff \tilde{f}$  ist stetig .

**Aufgabe 3** *Punktkompaktifizierung*

Sei  $X$  eine Menge mit einer Topologie  $\mathcal{O}$ . Definition:  $X$  ist *lokal kompakt*, falls für jeden Punkt  $x \in X$  ein  $U \in \mathcal{O}$  und ein  $K \subseteq X$  existieren, so dass  $U \subseteq K$ ,  $K$  kompakt, und  $x \in U$ .

Sei  $X$  lokal kompakt und Hausdorffsch. Die Punktkompaktifizierung von  $X$  ist  $\tilde{X} = X \cup \{q\}$  ( $q \notin X$  ist ein beliebiger Punkt) mit der Topologie  $\tilde{\mathcal{O}}$ , wobei  $\tilde{\mathcal{O}}$  durch

$$\tilde{\mathcal{O}} = \mathcal{O} \cup \{(X - K) \cup \{q\} : K \subseteq X, K \text{ kompakt} \}$$

gegeben ist. Zeigen Sie:

1.  $\tilde{\mathcal{O}}$  ist eine Topologie auf  $\tilde{X}$ .
2.  $\tilde{X}$  ist Hausdorffsch.
3.  $\tilde{X}$  ist kompakt.

(Zur Erinnerung: Eine Teilmenge  $A \subseteq X$  ist Kompakt genau dann, wenn jede offene Überdeckung von  $A$  eine endliche Überdeckung beinhaltet. Eine offene Überdeckung von  $A$  ist eine Teilmenge  $\mathcal{O}'$  von  $\mathcal{O}$  so dass  $A \subseteq \cup_{U \in \mathcal{O}'} U$ .

**Aufgabe 4** *Hausdorffsch oder nicht?*

Sei  $M = \mathbb{R} \cup \{p\}$ ,  $p$  ein beliebiger Punkt nicht in  $\mathbb{R}$ . Sei  $\mathcal{O}_{\mathbb{R}}$  die Standard-Topologie auf  $\mathbb{R}$ . Sei

$\mathcal{O} = \{U \cup V : U \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}}, V = \emptyset, \text{ oder } V = \{p\} \cup (W \setminus \{0\}), \text{ wobei } W \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}}, \text{ mit } 0 \in W\}$ .

1. Zeigen Sie dass  $\mathcal{O}$  eine Topologie auf  $M = \mathbb{R} \cup \{p\}$  ist.
2. Konstruieren Sie einen  $C^0$ -Atlas für  $(M, \mathcal{O})$ .
3. Ist  $M$  Hausdorfsch?

*Bitte schreiben Sie Ihre(n) Namen sowie die Nummer bzw. der Tag Ihrer Übungsgruppe auf jedes Lösungsblatt. Abgabe ist am Dienstag, 8.11.2005 bis 11:15.*