Übungsaufgaben zur Vorlesung Elementare DG Prof. Dr. G. Wang Dr. J. Scheuer

SS 2015, Serie 06 1.6.2015

Aufgabe 1 (Der Rotationstorus)

(4 Punkte)

(4 Punkte)

Der Rotationstorus ist durch

$$F(u, v) = ((R + r\cos u)\cos v, (R + r\cos u)\sin v, r\sin u), \quad 0 < u, v < 2\pi, 0 < r < R$$

gegeben, vgl. Aufgabe 2, Serie 05. Berechnen Sie die erste und zweite Fundamentalform, die Gaußkrümmung und die mittlere Krümmung.

Sei S eine reguläre Fläche und (U, F, V) eine lokale Parametrisierung mit $U = (0, A) \times (0, B)$. Man zeige, dass die folgenden Bedingungen äquivalent sind:

- (i) Für jedes Rechteck $R = [u^1, u^1 + a] \times [u^2, u^2 + b] \subset U$ sind die gegenüberliegenden Seiten von F(R) gleich lang.
- (ii) Es gilt $\frac{\partial g_{11}}{\partial u^2} = \frac{\partial g_{22}}{\partial u^1} = 0$ in ganz U.

Man zeige ferner, dass unter diesen beiden Bedingungen eine Parametertransformation $\phi:U\to \widetilde U$ existiert, so dass bzgl. der Parametrisierung $\widetilde F:=F\circ\phi^{-1}$ die erste Fundamentalform die Gestalt

$$\begin{pmatrix} 1 & \cos \theta \\ \cos \theta & 1 \end{pmatrix}$$

hat, wobei θ der Winkel zwischen den Koordinatenlinien ist. (*Hinweis. Setze* $\phi(u^1,u^2)=(\int\sqrt{g_{11}}du^1,\int\sqrt{g_{22}}du^2))$

Aufgabe 3 (geodätische und Normal-Krümmung, geodätische Torsion) (4 Punkte)

Es sei c eine nach Bogenlänge parametrisierte Kurve, deren Bild ganz innerhalb einer regulären Fläche S verläuft. Das Darboux-3-Bein E_1, E_2, E_3 ist dann definiert durch $E_1(s) = c'(s), E_3(s) = N(c(s)), E_2(s) = E_3(s) \times E_1(s)$. Dabei bezeichnet N bezeichnet die Einheitsnormale an die Fläche. Man leite für dieses 3-Bein die folgenden Ableitungsgleichungen her, die den Frenet-Gleichungen entsprechen:

$$\begin{pmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & \kappa_g & \kappa_n \\ -\kappa_g & 0 & \tau_g \\ -\kappa_n & -\tau_g & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{pmatrix}.$$

Dabei treten die folgenden Größen auf: $\kappa_g = \langle c'', E_2 \rangle$ (die geodätische Krümmung) $\kappa_n = II(c',c')$ (die Normalkrümmung) sowie eine geodätische Torsion τ_g .

Bitte wenden Sie!

Aufgabe 4 (Gauß-Abbildung kompakter Flächen)

(4 Punkte)

Sei $S \subset \mathbb{R}^3$ eine kompakte nicht leere reguläre Fläche.

- a) Zeigen Sie, dass die Gauß-Abbildung $N: S \to \mathbb{S}^2$ surjektiv ist.
- b) Zeigen Sie, dass $K \geq 0$, falls die Gauß-Abbildung auch injektiv ist.
- c) Verbessern Sie a) und zeigen Sie, dass die Einschränkung der Gauß-Abbildung auf $S_+ := \{x \in S | K(x) \ge 0\}$ surjektiv ist.

Bitte schreiben Sie Ihre(n) Namen, die Matrikelnummer sowie die Nummer Ihrer Übungsgruppe auf jedes Lösungsblatt. Abgabe ist am Montag, 8.6.15, vor der Vorlesung.