
Aufgabe 1 (*Kontaktmenge*) (4+4Punkte)

Seien $u \in C^2(\Omega)$ und $\nabla^2 u = (\partial_{ij}u)$ die Hessesche von u . Sie zeigen, dass $\nabla^2 u$ in Γ^+ nicht-positiv semidefinit ist.

(*Hinweis. Für $y \in \Gamma^+$ betrachten Sie die Funktion $w : \Gamma^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $w(x) = u(x) - u(y) - \nabla u(y) \cdot (x - y)$.*)

Aufgabe 2 (*Die Menge der Steigerungen*) (4 Punkte)

(a) Sei $v \in C(B_R(x_0))$ definiert durch

$$v(x) = h \left(1 - \frac{|x - x_0|}{R} \right)$$

Der Graph von v ist ein Kegel mit Spitze der Höhe h im Nullpunkt und der Sphäre $\partial B_R(x_0)$ als Basis. Sie bestimmen $\tau_v(y)$ für allen $y \in B_R(x_0)$.

(b) Seien Ω beschränkt und konvex und $u \in C(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ eine konkave Funktion mit $u = 0$ auf $\partial\Omega$. Fixiere $x_0 \in \Omega$. Sei v eine konkave Funktion, welcher Graph ein Kegel mit Spitze $(x_0, u(x_0))$ und dem Gebiet Ω als Basis ist, mit $v = 0$ auf $\partial\Omega$. Eigentlich kann man v so definieren, dass $v(tx_0 + (1-t)\tilde{x}) = tu(x_0)$. Setze

$$\mathcal{S} := \tau_v(x_0) = \{p \in \mathbb{R}^n \mid v(x) \leq v(x_0) + p \cdot (x - x_0) \text{ in } \Omega\}.$$

Sie zeigen, dass \mathcal{S} konvex ist und

$$\mathcal{S} \subset \nabla u(\Omega)$$

gilt.

Aufgabe 3 (*Elliptizität*) (4 Punkte)

Es sei $u \in C^2(\Omega)$ in dem Gebiet $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ eine Lösung der Monge-Ampère-Gleichung

$$\det(\partial_{ij}u(x)) = f(x)$$

mit positivem f . Es gebe ein $x_0 \in \Omega$, in dem die Hessesche von u positiv definit ist. Zeigen Sie, dass die Gleichung dann bei u in ganz Ω elliptisch ist. (Einfachhalber betrachten Sie nur $n = 2$. In diesen Fall ist $\det(\partial_{ij}u(x)) = u_{11}(x)u_{22}(x) - u_{12}^2(x)$.)

Definition 1.3 (Elliptizität.) Sei $F \in C^1(\mathbb{R}^{n^2} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \times \Omega)$. Eine Differentialgleichung $F(D^2u, Du, u, \cdot) = 0$ zweiter Ordnung mit $F = F(r_{ij}, p_i, z, u, x)$ heißt (in x entlang einer Lösung u) *elliptisch*, falls die Ableitung $(a^{ij})_{i,j} \equiv \left(\frac{\partial F}{\partial r_{ij}}(D^2u(x), Du(x), u(x), x)\right)_{i,j}$ symmetrisch und positiv definit ist.

Bitte schreiben Sie Ihre(n) Namen, die Matrikelnummer sowie die Nummer Ihrer Übungsgruppe auf jedes Lösungsblatt. Abgabe ist am Montag, 27.06., vor der Vorlesung.