

## 6. Euklidische Vektorräume

Im folgenden sei  $V$  ein Vektorraum über dem Körper  $\mathbb{R}$ .

(6.1) Def.: Eine Bilinearform  $b : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  heißt

- (i) symmetrisch  $\Leftrightarrow \forall v, w \in V: b(v, w) = b(w, v)$
- (ii) positiv definit  $\Leftrightarrow \forall v \in V \setminus \{0\}: b(v, v) > 0$
- (iii) Skalarprodukt  $\Leftrightarrow b$  ist symmetrisch und positiv definit.

Bez.: Für ein Skalarprodukt  $b$  schreibt man oft:  $\langle v, w \rangle := b(v, w)$ . Ein reeller Vektorraum  $V$  mit einem Skalarprodukt  $\langle, \rangle$  heißt ein euklidischer Vektorraum.

Bsp.: 1)  $V = \mathbb{R}^n, \quad b(x, y) := \langle x, y \rangle := \sum_{i=1}^n x_i y_i$   
 $b(x, x) = \sum_{i=1}^n x_i^2$

2)  $V = C^0([0, 2\pi], \mathbb{R}) = \{f \mid f : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R} \text{ stetig}\}$   
 $b(f_1, f_2) := \langle f_1, f_2 \rangle_{L^2} = \int_0^{2\pi} f_1(t) f_2(t) dt$

(6.2) Def.: Sei  $V, \langle, \rangle$  euklidischer Vektorraum. Dann heißt  $\|v\| := \sqrt{\langle v, v \rangle} \geq 0$  die Norm (oder Länge) von  $v \in V$  (bzgl.  $\langle, \rangle$ ) und  $\|v - w\|$  der Abstand zwischen  $v$  und  $w$ .

(6.3) Satz. Sei  $V, \langle, \rangle$  euklidischer Vektorraum. Dann gilt für alle  $v, w \in V, \lambda \in \mathbb{R}$ :

- (i)  $\|v\| \geq 0$  und:  $\|v\| = 0 \Leftrightarrow v = 0$
- (ii)  $\|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|$
- (iii)  $|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \|w\|$  (Cauchy-Schwarzsche Ungleichung) mit " $=$ "  $\Leftrightarrow v$  und  $w$  sind linear abhängig.
- (iv)  $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$  (Dreiecksungleichung)

Bew.:

- (i) ist klar
- (ii)  $\|\lambda v\| = \sqrt{\langle \lambda v, \lambda v \rangle} = \sqrt{\lambda^2 \langle v, v \rangle} = |\lambda| \|v\|$
- (iii) Es genügt, den Fall  $w \neq 0$  zu betrachten. Dann gilt für alle  $t \in \mathbb{R}$ :

$$0 \leq \langle v + tw, v + tw \rangle = \|v\|^2 + 2t \langle v, w \rangle + t^2 \|w\|^2$$

$$= \left( t \|w\| + \frac{\langle v, w \rangle}{\|w\|} \right)^2 + \|v\|^2 - \frac{\langle v, w \rangle^2}{\|w\|^2}$$

Als Funktion von  $t$  nimmt  $\langle v + tw, v + tw \rangle$  für  $t_0 = -\frac{\langle v, w \rangle}{\|w\|^2}$  sein (nichtnegatives!) Minimum an. Daraus folgt (iii). Gleichheit in (iii) tritt genau dann ein, wenn dieses Minimum gleich Null ist, d.h. falls  $\langle v + t_0 w, v + t_0 w \rangle = 0$ . Daraus folgt, daß  $v + t_0 w =$

0 gilt, d.h.  $v$  und  $w$  sind linear abhängig. Umgekehrt gilt für linear abhängige  $v$  und  $w$  offensichtlich Gleichheit in (iii).

(iv)

$$\begin{aligned} \|v+w\|^2 &= \langle v+w, v+w \rangle = \|v\|^2 + 2\langle v, w \rangle + \|w\|^2 \\ &\stackrel{\text{(iii)}}{\leq} \|v\|^2 + 2\|v\|\|w\| + \|w\|^2 = (\|v\| + \|w\|)^2. \end{aligned}$$

(6.4) Def. Sei  $V, \langle, \rangle$  euklidischer Vektorraum und  $v, w \in V \setminus \{0\}$ . Dann ist der Winkel  $\varphi = \varphi(v, w) \in [0, \pi]$  zwischen  $v$  und  $w$  definiert durch:

$$\cos \varphi = \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\|\|w\|} \quad \text{bzw.} \quad \varphi = \arccos \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\|\|w\|} \in [0, \pi]$$

Bem. 1) (5.3)(iii)  $\Rightarrow -1 \leq \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\|\|w\|} \leq 1$ .  $\cos : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$  ist bijektiv mit Umkehrabbildung  $\arccos$ .

2)  $\varphi(v, w) = \varphi(w, v)$

3)  $v$  und  $w$  heißen orthogonal (senkrecht) zueinander  $\Leftrightarrow \langle v, w \rangle = 0$

4) Die Definition von  $\varphi$  ist so eingerichtet, daß der "Kosinussatz" gilt:

$$\|v-w\|^2 = \|v\|^2 - 2\langle v, w \rangle + \|w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2 - 2\cos \varphi \|v\|\|w\|.$$

(6.5) Def.: Eine Teilmenge  $S \subseteq V$  heißt Orthonormalsystem (ONS), falls gilt

(i) Für alle  $v \in S$  gilt  $\|v\| = 1$  ("alle  $v \in S$  normiert") und

(ii)  $v, w \in S, v \neq w \Rightarrow \langle v, w \rangle = 0$  ("je zwei orthogonal")

Eine Orthonormalbasis (ONB) ist ein Orthonormalsystem, das  $V$  erzeugt.

Bem.:  $S$  ONS  $\Rightarrow S$  linear unabhängig:  $v_1, \dots, v_n \in S$  verschieden,  $r_1, \dots, r_n \in \mathbb{R}$  und  $\sum_{i=1}^n r_i v_i = 0 \Rightarrow 0 = \langle \sum_{i=1}^n r_i v_i, \sum_{j=1}^n r_j v_j \rangle = \sum_{i,j=1}^n r_i r_j \langle v_i, v_j \rangle = \sum_{i=1}^n r_i^2 \Rightarrow$  alle  $r_i = 0$ .

Bsp.:

1)  $V = \mathbb{R}^n, \langle x, y \rangle := \sum_{i=1}^n x_i y_i \Rightarrow \{e_1, \dots, e_n\}$  ist ONB von  $(\mathbb{R}^n, \langle, \rangle)$ .

2)  $V = C^0([0, 2\pi], \mathbb{R}), \langle, \rangle = \langle, \rangle_{L^2}$ .

Sei  $f_0 \in V$  definiert durch  $f_0(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$  und für  $k \geq 1$ :

$$f_k(x) := \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(kx), g_k(x) := \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(kx).$$

Dann ist  $S = \{f_k \mid k \in \mathbb{N}\} \cup \{g_k \mid k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\}$  ein ONS.

(6.6) Satz:

(i) (Besselsche Ungleichung). Ist  $S$  ONS,  $v \in V$  und  $E \subseteq S$  endlich, so gilt

$$\sum_{e \in E} \langle v, e \rangle^2 \leq \|v\|^2.$$

(ii) Ist  $B = (v_1, \dots, v_n)$  ONB von  $V$ , so gilt

$$v = \sum_{i=1}^n \langle v, v_i \rangle v_i.$$

Bem.: Im Fall von Bsp. 2) heißen  $a_k := \langle f, f_k \rangle_{L^2}$  für  $k \geq 0$  (d.h.  $a_k = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(kx) dx$  für  $k \geq 1$  und  $a_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) dx$ ) und  $b_k := \langle f, g_k \rangle_{L^2} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(kx) dx$  für  $k \geq 1$  die Fourierkoeffizienten von  $f \in V = C^0([0, 2\pi], \mathbb{R})$ . Aus (6.6)(i) folgt:

$$a_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) \leq \|f\|_{L^2}^2 = \int_0^{2\pi} f^2(x) dx.$$

In Wahrheit ist diese Ungleichung stets eine Gleichheit (man sagt zu dieser Eigenschaft, daß dieses  $S$  ein vollständiges ONS ist), aber das können wir hier nicht beweisen.

Bew.: (i)  $0 \leq \|v - \sum_{e \in E} \langle v, e \rangle e\|^2 = \|v\|^2 - 2 \sum_{e \in E} \langle v, e \rangle^2 + \sum_{e \in E} \langle v, e \rangle^2$

(ii)  $(v_1, \dots, v_n)$  Basis  $\Rightarrow \exists r_1, \dots, r_n \in \mathbb{R} : v = \sum_{j=1}^n r_j v_j \Rightarrow \langle v, v_i \rangle = \sum_{j=1}^n r_j \langle v_j, v_i \rangle = r_i$

(6.7) Satz (Gram-Schmidtsches Orthonormalisierungsverfahren). Seien  $v_1, \dots, v_k \in V$  linear unabhängig. Dann existiert ein ONS  $\tilde{v}_1, \dots, \tilde{v}_k \in V$  mit

$$\text{span}\{v_1, \dots, v_i\} = \text{span}\{\tilde{v}_1, \dots, \tilde{v}_i\}$$

für alle  $1 \leq i \leq k$ . Insbesondere: Ist  $V$  endlichdimensional, so existiert eine ONB von  $V$ .

Bew.: Induktion nach  $k$ :

$$k = 1 : \tilde{v}_1 = \frac{1}{\|v_1\|} v_1 \quad (v_1 \neq 0!)$$

Induktionsschritt: Nach Induktionsvoraussetzung existiert ein ONS  $\tilde{v}_1, \dots, \tilde{v}_{k-1}$  mit

$$\text{span}\{v_1, \dots, v_i\} = \text{span}\{\tilde{v}_1, \dots, \tilde{v}_i\} \text{ für alle } 1 \leq i \leq k-1.$$

Setze  $w_k = v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \langle v_k, \tilde{v}_j \rangle \tilde{v}_j$  ( $\Rightarrow \langle w_k, \tilde{v}_i \rangle = 0$  für  $1 \leq i \leq k-1$ ) und  $\tilde{v}_k := \frac{1}{\|w_k\|} w_k$ . Dann ist  $\tilde{v}_1, \dots, \tilde{v}_k$  ONS und  $\text{span}\{\tilde{v}_1, \dots, \tilde{v}_k\} = \text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$ .

(6.8) Def. Seien  $V, \langle, \rangle$  und  $\tilde{V}, \langle, \rangle$  euklidische Vektorräume. Ein  $L \in \text{Hom}(V, \tilde{V})$  heißt orthogonal (bzgl.  $\langle, \rangle$  und  $\langle, \rangle$ ), falls für alle  $v, w \in V$  gilt:  $\langle v, w \rangle = \langle L(v), L(w) \rangle$ . Bem.:

- 1)  $L$  orthogonal  $\Rightarrow L$  injektiv ( $L(v) = 0 \Rightarrow \|L(v)\|^2 = \|v\|^2 = 0 \Rightarrow v = 0$ )  
Speziell: Gilt  $\dim V = \dim \tilde{V} < \infty$ , so ist jede orthogonale Abbildung bijektiv.
- 2) Sei  $\tilde{V} = V, \dim V < \infty, \langle \cdot, \cdot \rangle = \langle \cdot, \cdot \rangle$ . Dann bilden die orthogonalen  $L \in \text{End}(V)$  eine Untergruppe von  $(\text{Aut}(V), \circ)$ , die orthogonale Gruppe  $O(V)$  von  $V$ .

(6.9) Folgerung. Ist  $V, \langle \cdot, \cdot \rangle_V$  euklidischer Vektorraum,  $\dim V = n$ , so existiert eine (bijektive) orthogonale Abbildung  $L : (V, \langle \cdot, \cdot \rangle_V) \rightarrow (\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ .

Bew.: Sei  $f_1, \dots, f_n$  ONB von  $V$ . Definiere  $L$  durch  $L(f_i) = e_i \in \mathbb{R}^n$ . Ist  $v = \sum r_i f_i$  und  $w = \sum s_j f_j$ , so folgt  $\langle v, w \rangle_V = \sum r_i s_i$ . Daraus folgt  $L(v) = \sum r_i e_i, L(w) = \sum s_j e_j$  und  $\langle L(v), L(w) \rangle = \sum r_i s_i = \langle v, w \rangle_V$ .

(6.10) Satz. Sei  $L \in \text{End}(V)$  und  $\mathcal{G} = (e_1, \dots, e_n)$  ONB von  $V$  und  $A = \text{Mat}_{\mathcal{G}}^{\mathcal{G}}(L)$ .

$$\text{Dann gilt: } L \in O(V) \Leftrightarrow A^T A = E_n \quad (\Leftrightarrow A^T = A^{-1})$$

$$\begin{aligned} \text{Bew.: } \delta_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle &= \langle L(e_i), L(e_j) \rangle = \left\langle \sum_{k=1}^n a_{ki} e_k, \sum_{l=1}^n a_{lj} e_l \right\rangle \\ &= \sum_{k,l=1}^n a_{ki} a_{lj} \delta_{kl} = \sum_{k=1}^n a_{ki} a_{kj} \\ &\Leftrightarrow A^T A = E_n. \end{aligned}$$

## Die Hauptachsentransformation

Im folgenden sei  $V$  ein  $n$ -dimensionaler  $\mathbb{R}$ -Vektorraum mit Skalarprodukt  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  und  $b : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  eine symmetrische Bilinearform. Ist  $(e_1, \dots, e_n)$  eine Basis von  $V$  und sind  $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, y = \sum_{j=1}^n y_j e_j$  beliebige Vektoren in  $V$ , so folgt aus der Bilinearität von  $b$ :

$$b(x, y) = b\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j b(e_i, e_j).$$

Man nennt die Matrix  $B = (b_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$  mit  $b_{ij} = b(e_i, e_j)$  die Matrix von  $b$  bzgl. der Basis  $(e_1, \dots, e_n)$ . Ist  $b$  symmetrisch (wie wir vorausgesetzt haben), so gilt  $b_{ij} = b(e_i, e_j) = b(e_j, e_i) = b_{ji}$ , d.h.  $B = B^T$  (solche Matrizen heißen symmetrisch). Es gilt dann für  $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, y = \sum_{j=1}^n y_j e_j$ :

$$b(x, y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i b_{ij} y_j = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix},$$

wobei der letzte Term als Produkt von Matrizen zu interpretieren ist.

Besonders einfach zu verstehen ist eine Bilinearform  $b$ , deren Matrix (bzgl.  $e_1, \dots, e_n$ ) eine Diagonalmatrix  $b_{ij} = \lambda_i \delta_{ij}$  ist. Dann gilt:

$$b(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i \lambda_i y_i.$$

Zum Beispiel ist ein soches  $b$  genau dann positiv definit, wenn alle  $\lambda_i$  (für  $i = 1, \dots, n$ ) positiv sind.

(6.11) Satz (Hauptachsentransformation). *Zu jeder symmetrischen Bilinearform  $b : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  existiert eine ONB  $f_1, \dots, f_n$  von  $V$  und  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ , so daß für alle  $x = \sum_{i=1}^n x_i f_i$ ,  $y = \sum_{j=1}^n y_j f_j$  in  $V$  gilt*

$$b(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i \lambda_i y_i.$$

*Anders ausgedrückt: Es existiert stets eine ONB von  $V$ , bezüglich derer die Matrix von  $b$  eine Diagonalmatrix ist. (Die  $\lambda_i$  sind dann gerade die Diagonalelemente der Matrix.)*

Herkunft der Bezeichnung ‘‘Hauptachsentransformation’’: Ist  $b : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  positiv definite, symmetrische Bilinearform, so ist die Menge

$$E = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid b(x, x) = 1\}$$

eine Ellipse. Satz (6.11) besagt, daß es eine ONB  $f_1, f_2$  (bzgl. des üblichen Skalarprodukts) gibt, so daß

$$E = \{x = x_1 f_1 + x_2 f_2 \in \mathbb{R}^2 \mid \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 = 1\}$$

gilt, d.h. die Geraden durch  $0 \in \mathbb{R}^2$  in Richtung  $f_1$  bzw.  $f_2$  sind die ‘‘Hauptachsen’’ der Ellipse  $E$  mit zugehörigen Achsenabschnitten der Länge  $(\lambda_1)^{-\frac{1}{2}}$  bzw.  $(\lambda_2)^{-\frac{1}{2}}$ .

Satz (6.11) spielt in folgendem Zusammenhang in der Analysis II eine Rolle (‘‘Kurvendiskussion für Funktionen  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ’’): Ist  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  zweimal stetig differenzierbar,  $x_0 \in \mathbb{R}^n$  und  $h \in \mathbb{R}^n$ , so gilt (siehe Analysis II)

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + Df(x_0)(h) + \frac{1}{2} D^2 f(x_0)(h, h) + R_{f, x_0}(h),$$

wobei  $Df(x_0) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  linear (1. Ableitung von  $f$  an der Stelle  $x_0$ ),  $D^2 f(x_0) : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  symmetrisch, bilinear (2. Ableitung von  $f$  an der Stelle  $x_0$ ), und  $R_{f, x_0}(h)$  eine Funktion mit  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{R_{f, x_0}(h)}{\|h\|^2} = 0$  ist.

$x_0$  heißt kritischer Punkt von  $f$ , falls  $Df(x_0) = 0$  gilt. Aus (6.11) folgt, daß man eine ONB des  $\mathbb{R}^n$  finden kann, bzgl. derer  $D^2 f(x_0)(h, h) = \sum_{i=1}^n \lambda_i h_i^2$  gilt. Daraus folgt für einen

kritischen Punkt  $x_0$  von  $f$ :

$$\begin{aligned} \text{alle } \lambda_i > 0 \ (\Leftrightarrow D^2 f(x_0) \text{ positiv definiert}) &\Rightarrow x_0 \text{ lokales Minimum.} \\ \text{alle } \lambda_i < 0 \ (\Leftrightarrow D^2 f(x_0) \text{ negativ definiert}) &\Rightarrow x_0 \text{ lokales Maximum.} \end{aligned}$$

Im Gegensatz zum (aus der Schule bekannten) Fall  $n = 1$  gibt es für  $n > 1$  noch andere wichtige Möglichkeiten für  $D^2 f(x_0)$ : Es kann z.B. für  $n = 2$   $\lambda_1 > 0$  und  $\lambda_2 < 0$  gelten. Dann sieht der Graph von  $f$  in einer Umgebung von  $x_0$  wie eine ‘‘Sattelfläche’’ aus.

Vorbereitung zum Beweis von Satz (6.11):

Wegen (6.9) können wir annehmen, daß  $V = \mathbb{R}^n$ ,  $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$  gilt. Ist nämlich  $L : \mathbb{R}^n \rightarrow V$  orthogonal, so betrachte  $\tilde{b} : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\tilde{b}(x, y) := b(L(x), L(y))$ . Haben wir die Behauptung für  $\tilde{b}$  bewiesen, so folgt sie leicht auch für  $b$ . (Als gesuchte ONB von  $V$  kann gerade das Bild unter  $L$  einer ONB des  $\mathbb{R}^n$  genommen werden, die  $\tilde{b}$  diagonalisiert.)

Unter leichtem Missbrauch der Bezeichnung verwenden wir  $B$  auch als Symbol für die lineare Abbildung  $B : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  mit  $B(e_i) = \sum_{j=1}^n b_{ij} e_j = \sum_{j=1}^n b_{ji} e_j$ . Dann gilt:

$$(6.12) \text{ Lemma. } b(x, y) = \langle B(x), y \rangle = \langle x, B(y) \rangle \text{ für alle } x, y \in \mathbb{R}^n.$$

Bem.: Ein  $B \in \text{End}(\mathbb{R}^n)$  mit  $\langle B(x), y \rangle = \langle x, B(y) \rangle$  für alle  $x, y \in \mathbb{R}^n$  heißt ‘‘selbstadjungiert’’.

$$\begin{aligned} \text{Bew.: } \langle B(x), y \rangle &= \left\langle B \left( \sum_{i=1}^n x_i e_i \right), \sum_{k=1}^n y_k e_k \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n x_i y_k \langle B(e_i), e_k \rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_k b_{ij} \underbrace{\langle e_j, e_k \rangle}_{=\delta_{jk}} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j b_{ij} \\ &= b(x, y) \end{aligned}$$

Da  $b$  symmetrisch ist, folgt daraus:

$$\langle x, B(y) \rangle = \langle B(y), x \rangle = b(y, x) = b(x, y) = \langle B(x), y \rangle.$$

Satz (6.11) ist also äquivalent dazu, daß es für jedes selbstadjungierte  $B \in \text{End}(\mathbb{R}^n)$  eine ONB  $f_1, \dots, f_n$  des  $\mathbb{R}^n$  aus Eigenvektoren von  $B$  gibt. Sind dann  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  die zugehörigen Eigenwerte von  $B$ , d.h.  $B(f_i) = \lambda_i f_i$  für  $i = 1, \dots, n$ , so gilt:

$$b_{ij} = b(f_i, f_j) = \langle B(f_i), f_j \rangle = \lambda_i \langle f_i, f_j \rangle = \lambda_i \delta_{ij}, \text{ wie in (6.11) behauptet.}$$

Im ersten (schwierigeren) Schritt zeigen wir:

1. Schritt:  $B$  besitzt einen Eigenwert  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

Sei  $\tilde{B} \in \text{End}(\mathbb{C}^n)$  die  $\mathbb{C}$ -lineare Fortsetzung von  $B \in \text{End}(\mathbb{R}^n)$  auf  $\mathbb{C}^n$ , d.h.  $\tilde{B}(z_1, \dots, z_n) =$

$\left(\sum_{i=1}^n b_{1i}z_i, \sum_{i=1}^n b_{2i}z_i, \dots, \sum_{i=1}^n b_{ni}z_i\right)$ . Wir verwenden nun (ohne das bewiesen zu haben), daß  $\mathbb{C}$  algebraisch abgeschlossen ist. Daraus folgt, daß es einen Eigenwert  $\lambda \in \mathbb{C}$  von  $\tilde{B}$  gibt (vgl. (5.24) und die daran anschließenden Bemerkungen).

Wir wollen zeigen, daß in Wahrheit  $\lambda \in \mathbb{R}$  gilt. Sei  $v = x + iy \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$  mit  $x, y \in \mathbb{R}^n$  ein EV zum EW  $\lambda = \alpha + i\beta$ ,  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ , von  $\tilde{B}$ . Dann gilt

$$\tilde{B}(x + iy) = B(x) + iB(y) \text{ mit } B(x), B(y) \in \mathbb{R}^n$$

und andererseits wegen  $\tilde{B}(v) = \lambda v$ :

$$\tilde{B}(x + iy) = (\alpha + i\beta)(x + iy) = (\alpha x - \beta y) + i(\beta x + \alpha y).$$

Also:

$$(*) \quad B(x) = \alpha x - \beta y \text{ und } B(y) = \beta x + \alpha y$$

Aus (\*) folgt mit (6.12):

$$\langle B(x), y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle - \beta \|y\|^2 = \langle x, B(y) \rangle = \beta \|x\|^2 + \alpha \langle x, y \rangle.$$

Also  $0 = \beta(\|x\|^2 + \|y\|^2)$ , woraus wegen  $\|x\|^2 + \|y\|^2 > 0$  (da  $v \neq 0!$ )  $\beta = 0$  folgt, d.h.  $\lambda = \alpha \in \mathbb{R}$  und, nach (\*),

$$B(x) = \lambda x, B(y) = \lambda y.$$

Da  $v = x + iy \neq 0$  gilt, sind nicht beide  $x$  und  $y$  der Nullvektor, d.h. mindestens einer von beiden ist ein Eigenvektor von  $B$  (zum EW  $\lambda = \alpha \in \mathbb{R}$ ).

2. Schritt: Induktion über  $n = \dim \mathbb{R}^n$ .

$n = 1$ : Wähle  $f_1 := e_1 \in \mathbb{R}^1$ . Dann gilt:  $b(x_1 e_1, x_1 e_1) = x_1^2 \underbrace{b(e_1, e_1)}_{=: \lambda_1}$ .

$n > 1$ : Wähle als  $f_1 \in \mathbb{R}^n$  einen (nach Schritt 1 existierenden) Eigenvektor von  $B$ , der ohne Einschränkung als normiert angenommen werden kann, d.h.  $\|f_1\| = 1$ . Betrachte

$$(**) \quad U := \{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle x, f_1 \rangle = 0\}.$$

Dann ist  $U$  ein  $(n - 1)$ -dimensionaler Untervektorraum des  $\mathbb{R}^n$  (vgl. (3.24)) und die Restriktion  $\langle, \rangle \mid U \times U$  von  $\langle, \rangle$  auf  $U$  ist ein Skalarprodukt auf  $U$ . Entscheidend ist nun, daß  $B(U) \subseteq U$  gilt: Ist  $x \in U$ , d.h.  $x \in \mathbb{R}^n$  und  $\langle x, f_1 \rangle = 0$ , so folgt  $B(x) \in \mathbb{R}^n$  und

$$\langle B(x), f_1 \rangle \stackrel{(6.12)}{=} \langle x, B(f_1) \rangle = \langle x, \lambda_1 f_1 \rangle = \lambda_1 \langle x, f_1 \rangle = 0,$$

d.h.  $B(x) \in U$ .  $B \mid U$  ist also ein selbstadjungierter Endomorphismus von  $U$ , so daß nach der Induktionsvoraussetzung die Existenz einer ONB  $f_2, \dots, f_n$  von  $U$  aus Eigenvektoren von  $B \mid U$  ( $\Rightarrow$  von  $B$ ) existiert. Wegen (\*\*\*) ist dann  $f_1, \dots, f_n$  eine ONB des  $\mathbb{R}^n$  aus Eigenvektoren von  $B$ .

## Orthogonales Komplement und Orthogonalprojektion

Wir betrachten weiterhin einen euklidischen Vektorraum  $V, \langle, \rangle$ .

(6.13) Def.: Ist  $M \subseteq V$ , so heißt

$$M^\perp := \{v \in V \mid \forall w \in M : \langle v, w \rangle = 0\}$$

das orthogonale Komplement von  $M$ .

(6.14) Fakt.

- (i)  $M^\perp$  ist Untervektorraum von  $V$ .
- (ii)  $M_1 \subseteq M_2 \subseteq V \Rightarrow M_2^\perp \subseteq M_1^\perp$
- (iii)  $M^\perp = (\text{span}(M))^\perp$
- (iv)  $M \subseteq (M^\perp)^\perp$

Bew. von (iii): Wegen (ii) genügt es,  $M^\perp \subseteq (\text{span}(M))^\perp$  zu beweisen. Sei also  $v \in M^\perp$ . Wir müssen zeigen, daß für alle  $w \in \text{span}(M)$  gilt:  $\langle v, w \rangle = 0$ . Zu jedem  $w \in \text{span}(M)$  existieren  $k \in \mathbb{N}$ ,  $r_1, \dots, r_k \in \mathbb{R}$  und  $w_1, \dots, w_k \in M$ :

$$w = \sum_{i=1}^k r_i w_i \quad (\text{siehe (3.7)}).$$

Wegen  $v \in M^\perp$  und  $w_i \in M$  gilt  $\langle v, w_i \rangle = 0$  für  $1 \leq i \leq k$ . Also:

$$\langle v, w \rangle = \langle v, \sum_{i=1}^k r_i w_i \rangle = \sum_{i=1}^k r_i \langle v, w_i \rangle = 0.$$

Bsp.:  $V = \mathbb{R}^3$  mit dem Standardskalarprodukt

$$\begin{aligned} M = \{e_1, e_2\} &\Rightarrow \text{span}(M) = \mathbb{R}^2 \times \{0\} \\ M^\perp = (\text{span}(M))^\perp &= \{(0, 0)\} \times \mathbb{R} \end{aligned}$$

(6.15) Satz. Sei  $\dim V < \infty$ . Dann gilt für jeden Untervektorraum  $U$  von  $V$ :

$$U \oplus U^\perp = V \quad \text{und} \quad (U^\perp)^\perp = U.$$

Speziell:  $\dim U + \dim U^\perp = \dim V$ .

Bew.: Sei  $\dim U =: k$ . Ergänze eine Basis  $(v_1, \dots, v_k)$  von  $U$  zu einer Basis  $(v_1, \dots, v_n)$  von  $V$ , vgl. (3.16). Nach (6.7) (Gram-Schmidt) existiert eine ONB  $(w_1, \dots, w_n)$  von  $V$ , so daß

$$\text{span}\{w_1, \dots, w_k\} = \text{span}\{v_1, \dots, v_k\} = U$$

gilt. Wir zeigen, daß  $U^\perp = \text{span}\{w_{k+1}, \dots, w_n\}$  gilt. Denn:

- (i) Ist  $i \leq k < j$ , so gilt  $\langle w_i, w_j \rangle = 0$ , also  $w_j \in \{w_1, \dots, w_k\}^\perp = U^\perp$ . Wegen (6.14)(i) folgt  $\text{span}\{w_{k+1}, \dots, w_n\} \subseteq U^\perp$ .
- (ii) Ist  $v = \sum_{j=1}^n r_j w_j \in U^\perp$ , so gilt für  $1 \leq i \leq k$ :

$$0 = \langle v, w_i \rangle = \sum_{j=1}^n r_j \langle w_j, w_i \rangle = r_i.$$

$$\text{Also } v = \sum_{j=k+1}^n r_j w_j \in \text{span}\{w_{k+1}, \dots, w_n\}^\perp.$$

Aus  $U = \text{span}\{w_1, \dots, w_k\}$  und  $U^\perp = \text{span}\{w_{k+1}, \dots, w_n\}$  folgt  $V = U \oplus U^\perp$  und  $(U^\perp)^\perp = U$ .

Bem.: 1) Der Beweis von (6.15) liefert ein Rechenverfahren zur Bestimmung einer ONB  $\{w_1, \dots, w_n\}$  von  $V$ , so daß  $\{w_1, \dots, w_k\}$  eine ONB von  $U$  und  $\{w_{k+1}, \dots, w_n\}$  eine ONB von  $U^\perp$  ist.

2) (6.15) gilt nicht ohne die Voraussetzung  $\dim V < \infty$ !

Ist  $U$  Untervektorraum eines endlich-dimensionalen euklidischen Vektorraums  $V$ , so ist  $U^\perp$  ein zu  $U$  komplementärer Vektorraum, vgl. (3.21). Unter den vielen zu  $U$  komplementären Untervektorräumen ist  $U^\perp$  durch die Eigenschaft ausgezeichnet, daß jedes  $v \in U^\perp$  zu allen  $u \in U$  orthogonal ist (d.h. der Name "orthogonales Komplement"). Ist  $\dim V = \infty$ , so kann  $U \oplus U^\perp \subsetneq V$  gelten. In diesem Fall ist das orthogonale Komplement  $U^\perp$  also kein zu  $U$  komplementärer Unterraum. (Ein "orthogonales Komplement" ist also nicht notwendig ein "Komplement". So etwas tritt in der mathematischen Sprache öfters auf, wie auch in der Umgangssprache, in der mit einem "tollen Hecht" oft kein Hecht gemeint ist.)

(6.16) Def.: Sei  $U$  Untervektorraum von  $V$  und  $V = U \oplus U^\perp$ . Dann existiert für jedes  $v \in V$  genau ein Paar  $(u_0, u_1) \in U \times U^\perp$ , so daß  $v = u_0 + u_1$  gilt. Die Abbildung  $P_U : V \rightarrow U$ ,  $P_U(v) := u_0$ , heißt Orthogonalprojektion von  $V$  auf  $U$ .

Bem.:

- 0)  $P_U(v)$  ist durch die Eigenschaften  $P_U(v) \in U$  und  $v - P_U(v) \in U^\perp$  eindeutig bestimmt.
- 1)  $P_U \in \text{Hom}(V, U)$ .
- 2) Für alle  $u \in U$  gilt  $P_U(u) = u$  (d.h.  $P_U|_U = \text{id}_U$ ) und für alle  $v \in U^\perp$  gilt  $P_U(v) = 0$ .
- 3) Ist  $(v_1, \dots, v_k)$  ONB von  $U$ , so gilt für alle  $v \in V$ :

$$P_U(v) = \sum_{i=1}^k \langle v, v_i \rangle v_i.$$

- 4) Ist  $(v_{k+1}, \dots, v_n)$  ONB von  $U^\perp$ , so gilt für alle  $v \in V$ :

$$P_U(v) = v - \sum_{i=k+1}^n \langle v, v_i \rangle v_i.$$

Bez.: Ist  $\emptyset \neq M \subseteq V$  und  $v \in V$ , so heißt

$$d(v, M) := \inf\{\|v - u\| \mid u \in M\}$$

der Abstand von  $v$  zu  $M$ .

(6.17) Satz. Sei  $U \subseteq V$  Untervektorraum und  $V = U \oplus U^\perp$ . Dann gilt für jedes  $v \in V$ : Es existiert genau ein  $\bar{u} \in U$  mit  $d(v, U) = \|v - \bar{u}\|$ , nämlich  $\bar{u} = P_U(v)$ .

Speziell gilt:  $d(v, U) = \|v - P_U(v)\|$ .

Bew.: Sei  $u \in U$  beliebig. Zerlege  $v = P_U(v) + (v - P_U(v))$ , wobei  $P_U(v) \in U$ ,  $(v - P_U(v)) \in U^\perp$ . Dann gilt

$$\|v - u\|^2 = \|(P_U(v) - u) + (v - P_U(v))\|^2 = \|(P_U(v) - u)\|^2 + \|v - P_U(v)\|^2.$$

Also  $\|v - u\| \geq \|v - P_U(v)\|$ , wobei Gleichheit genau für  $u = P_U(v)$  eintritt.

Bsp.: Approximation komplizierter Funktionen durch einfache: die Fourierentwicklung. Wir betrachten den  $\mathbb{R}$ -Vektorraum

$$V = C^0([0, 2\pi], \mathbb{R}) = \{f \mid f : [0, 2\pi] \rightarrow \text{stetig}\}$$

mit dem sogenannten  $L^2$ -Skalarprodukt

$$\langle f, g \rangle := \int_0^{2\pi} f(x)g(x)dx$$

und dem ONS  $f_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ ,  $f_k(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(kx)$ ,  $g_k(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(kx)$ , vgl. Bsp. 1 nach (6.1) und Bsp. nach (6.5). Es sei

$$U_n := \text{span}\{f_0, \dots, f_n, g_1, \dots, g_n\}.$$

Wegen Bem. 3 nach (6.16) gilt für alle  $f \in V$ :

$$(*) \quad P_{U_n}(f) = \sum_{k=0}^n \langle f, f_k \rangle f_k + \sum_{k=1}^n \langle f, g_k \rangle g_k.$$

Im Gegensatz zu dem nach (6.6) geschriebenen, definiert man üblicherweise die Fourierkoeffizienten  $a_k = a_k(f)$  und  $b_k = b_k(f)$  durch

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(kx) dx = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \langle f, f_0 \rangle & \text{für } k = 0 \\ \frac{1}{\sqrt{\pi}} \langle f, f_k \rangle & \text{für } k > 0 \end{cases}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(kx) dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \langle f, g_k \rangle \text{ für } k > 0.$$

Damit schreibt sich (\*) als

$$P_{U_n}(f)(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)).$$

Satz (6.17) besagt, daß  $P_{U_n}(f)$  das eindeutig bestimmte Element von  $U_n$  mit minimalem  $L^2$ -Abstand von  $f$  ist, d.h. die beste ( $L^2$ -)Approximation von  $f$  durch ein Element von  $U_n$ .

Die (hier nicht bewiesene) Tatsache, daß  $\{f_0\} \cup \{f_k, g_k \mid k > 0\}$  ein vollständiges ONS bilden, heißt gerade, daß für jedes  $f \in V$  gilt

$$\left( \lim_{n \rightarrow \infty} d(f, U_n) \right) \lim_{n \rightarrow \infty} \|f - P_{U_n}(f)\| = 0.$$

**Die Gramsche Determinante** (J.P. Gram, dän. Math. 1850-1916)

(6.18) Satz. Sei  $V$  euklidischer Vektorraum,  $0 < \dim V = n < \infty$ . Dann existieren genau zwei Determinantenformen  $\pm D$  auf  $V$ , so daß gilt:

$$\text{Ist } v_1, \dots, v_n \text{ ONB von } V, \text{ so gilt } |\pm D(v_1, \dots, v_n)| = 1.$$

Bez.: Ein solches  $D$  heie normierte Determinantenform des euklidischen Vektorraums  $V$ .

Bew.: Existenz: Sei  $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n)$  eine (feste) ONB von  $V$ . Nach (5.10) existiert genau eine Determinantenform  $D$  von  $V$  mit

$$D(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n) = 1.$$

Wir mssen zeigen, da dann fr jede ONB  $(v_1, \dots, v_n)$  von  $V$   $|D(v_1, \dots, v_n)| = 1$  gilt. Sei  $L \in \text{End } V$  durch  $L(\bar{v}_i) = v_i$  fr  $1 \leq i \leq n$  definiert. Nach Definition (5.19) gilt:

$$D(v_1, \dots, v_n) = \det L \quad D(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n) = \det L.$$

Nach (6.10) gilt fr die Matrix  $A$  von  $L$  bzgl.  $(v_1, \dots, v_n)$ :

$$A^T A = E_n.$$

Also  $1 = \det E_n = \det(A^T A) \stackrel{(5.20)}{=} \det A^T \det A \stackrel{(5.17)}{=} (\det A)^2 \stackrel{(5.21)}{=} (\det L)^2$  und damit

$$|D(v_1, \dots, v_n)| = |\det L| = 1.$$

Da  $\pm D$  die einzigen solchen Determinantenformen sind, folgt direkt aus (5.10).

Aus Satz (6.18) folgt, da in endlich-dimensionalen euklidischen Vektorrumen  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  ein natrlicher Volumenbegriff fr Paralleletope existiert. Ist  $D$  eine normierte Determinantenform und sind  $w_1, \dots, w_n \in V$ , so definieren wir

$$\text{vol}_n^{(\cdot)}(P(w_1, \dots, w_n)) := |D(w_1, \dots, w_n)|.$$

Ist  $(v_1, \dots, v_n)$  eine ONB von  $V$ , so nennt man  $P(v_1, \dots, v_n)$  einen Wrfel der Kantenlnge 1, und es folgt:

$$\text{vol}_n^{(\cdot)}(P(v_1, \dots, v_n)) = 1.$$

Die Gramsche Determinante berechnet  $\text{vol}_n^{(\cdot)}(P(w_1, \dots, w_n))$  mittels der Skalarprodukte  $\langle w_i, w_k \rangle$  fr  $1 \leq i, k \leq n$ :

(6.19) Satz (Gramsche Determinante). Sei  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$   $n$ -dimensionaler euklidischer Vektorraum und  $w_1, \dots, w_n \in V$ . Dann gilt

$$\text{vol}_n^{(\cdot)}(P(w_1, \dots, w_n)) = \sqrt{\det((\langle w_i, w_k \rangle)_{1 \leq i, k \leq n})}.$$

Bsp.: Wir betrachten  $\mathbb{R}^2$  mit dem Standardskalarprodukt. Dann ist  $D_0$  eine normierte Determinantenform, da  $D_0(e_1, e_2) = 1$ . In diesem Fall sagt (6.19):

$$\begin{aligned} \text{vol}_2^{(\cdot)}(P(w_1, w_2)) &= \sqrt{\det \begin{pmatrix} \langle w_1, w_1 \rangle & \langle w_1, w_2 \rangle \\ \langle w_2, w_1 \rangle & \langle w_2, w_2 \rangle \end{pmatrix}} = \sqrt{\|w_1\|^2 \|w_2\|^2 - \langle w_1, w_2 \rangle^2} \\ &= \|w_1\| \|w_2\| \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} = \|w_1\| \|w_2\| \sin \varphi, \end{aligned}$$

wobei  $\varphi$  den Winkel zwischen  $w_1$  und  $w_2$  bezeichnet. Das ist die Formel für die Fläche des Parallelogramms  $P(w_1, w_2)$  mit den Seitenlängen  $\|w_1\|$  und  $\|w_2\|$  und dem eingeschlossenen Winkel  $\varphi$ .

Beweis von (6.19): Sei  $\mathcal{G} = (v_1, \dots, v_n)$  eine ONB von  $V$  und  $L \in \text{End}(V)$  durch  $L(v_j) = w_j$  für  $1 \leq j \leq n$  definiert. Dann ist  $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} = \text{Mat}_{\mathcal{G}}^{\mathcal{G}}(L)$  durch

$$w_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} v_i$$

definiert, und es gilt mit einer normierten Determinantenform  $D$ :

$$(*) \quad \text{vol}_n^{(\cdot)}(P(w_1, \dots, w_n)) = |D(w_1, \dots, w_n)| = |\det A| |D(v_1, \dots, v_n)| = |\det A|.$$

Andererseits:

$$\begin{aligned} \langle w_i, w_k \rangle &= \left\langle \sum_{j=1}^n a_{ji} v_j, \sum_{l=1}^n a_{lk} v_l \right\rangle = \sum_{j,l=1}^n a_{ji} a_{lk} \underbrace{\langle v_j, v_l \rangle}_{=\delta_{jl}} = \sum_{j=1}^n a_{ji} a_{jk} \\ &= (A^T \cdot A)_{ik} \end{aligned}$$

Also:  $(\langle w_i, w_k \rangle)_{1 \leq i, k \leq n} = A^T A$ .

Daraus folgt:  $(**) \det(\langle w_i, w_k \rangle)_{1 \leq i, k \leq n} = \det(A^T A) = (\det A)^2$ .

Aus (\*) und (\*\*) folgt die Behauptung.

Jeder Unterraum  $U$  eines euklidischen Vektorraums  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  "erbt" das Skalarprodukt von  $V$ , d.h.  $\langle \cdot, \cdot \rangle|_U \times U$  ist ein Skalarprodukt auf  $U$ . Damit ist auch das Volumen von  $k$  ( $\leq n$ )-dimensionalen Parallelotopen in  $V$  definiert:

Sind  $v_1, \dots, v_k \in V$  linear unabhängig, so heißt

$$P(v_1, \dots, v_k) = \left\{ \sum_{i=1}^k s_i v_i \mid 0 \leq s_i \leq 1 \right\} \subseteq \text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$$

das von  $v_1, \dots, v_k$  aufgespannte ( $k$ -dimensionale) Parallelotop.

Ist  $D^U$  normierte Determinantenform auf  $U := \text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$ , so besagt (6.19)

$$|D^U(v_1, \dots, v_k)| = \sqrt{\det(\langle v_i, v_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq k}}$$

und wir definieren diesen Wert als das  $k$ -dimensionale Volumen  $\text{vol}_k^{\langle \cdot, \cdot \rangle}(P(v_1, \dots, v_k))$  von  $P(v_1, \dots, v_k)$ . Sind  $v_1, \dots, v_k$  linear abhängig, so definieren wir  $\text{vol}_k^{\langle \cdot, \cdot \rangle}(P(v_1, \dots, v_k)) = 0$ .

## Orthogonale Abbildungen

Wir wollen die orthogonale Endomorphismen  $L \in O(V)$  eines euklidischen Vektorraums  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  untersuchen.

Erinnerung (an Def. (6.8)):

$$L \in O(V) \Leftrightarrow L \in \text{End}(V) \text{ und für alle } v, w \in V \text{ gilt } \langle L(v), L(w) \rangle = \langle v, w \rangle.$$

Solche  $L \in O(V)$  sind stets injektiv und damit – falls  $\dim V < \infty$  – auch surjektiv. Wir setzen voraus, daß  $\dim V = n < \infty$  gilt. Dann ist  $O(V)$  eine Untergruppe von  $\text{Aut}(V)$  (mit der Hintereinanderausführung von Abbildungen als Gruppenoperation). Nach Satz (6.10) gilt: Ist  $\mathcal{G} = (v_1, \dots, v_n)$  ONB von  $V$ , ist  $L \in \text{End}(V)$  und  $A := \text{Mat}_{\mathcal{G}}^{\mathcal{G}}(L)$ , so gilt:

$$L \in O(V) \Leftrightarrow A^T \cdot A = E_n.$$

Speziell folgt daraus (wie im Beweis von (6.18) schon benutzt):

$$L \in O(V) \Rightarrow |\det L| = |\det A| = 1.$$

(6.20) Def.:  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  heißt orthogonal  $\Leftrightarrow A^T A = E_n$

$$O(n) := \{A \mid A \in \mathbb{R}^{n \times n} \text{ orthogonal}\}$$

$$SO(n) := \{A \mid A \in O(n), \det A = 1\} = O(n) \cap \text{SL}_n(\mathbb{R})$$

$$SO(V) := \{L \mid L \in O(V), \det L = 1\}$$

Da  $\text{Mat}_{\mathcal{G}}^{\mathcal{G}} : (\text{Aut}(V), \circ) \rightarrow (\text{GL}_n(\mathbb{R}), \cdot)$  ein Gruppenisomorphismus ist (vgl. (4.18)), ist  $O(n) = \text{Mat}_{\mathcal{G}}^{\mathcal{G}}(O(V))$  eine Untergruppe von  $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ . Ebenso ist  $SO(n)$  (bzw.  $SO(V)$ ) Untergruppe von  $O(n)$  (bzw. von  $O(V)$ ).

Wir beschäftigen uns zunächst mit dem Spezialfall  $V = \mathbb{R}^2$ ,  $\langle \cdot, \cdot \rangle = \text{Standardskalarprodukt}$ , d.h.

$$\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle := x_1 y_1 + x_2 y_2.$$

Beispiele von Elementen in  $O(\mathbb{R}^2)$ :

1) “Drehungen”: Sei  $\varphi \in \mathbb{R}$  und  $D_\varphi \in \text{End}(\mathbb{R}^2)$  mit

$$\text{Mat}(D_\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} \text{Mat}(D_\varphi)^T \cdot \text{Mat}(D_\varphi) &= \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi & 0 \\ 0 & \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

d.h.  $\text{Mat}(D_\varphi) \in O(2)$  und damit  $D_\varphi \in O(\mathbb{R}^2)$ . Wegen

$$\begin{vmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{vmatrix} = 1 \text{ gilt sogar } D_\varphi \in SO(\mathbb{R}^2), \text{Mat}(D_\varphi) \in SO(2).$$

Offenbar gilt  $D_{\varphi+2\pi} = D_\varphi$  und  $D_\varphi \neq D_\psi$ , falls  $0 \leq \varphi < \psi < 2\pi$ .

- 2) "Spiegelungen an Geraden durch  $0 \in \mathbb{R}^2$ ": Sei  $U \subseteq \mathbb{R}^2$  1-dimensionaler Untervektorraum. Wähle eine ONB  $\mathcal{G} = (v_1, v_2)$  des  $\mathbb{R}^2$  mit  $\text{span}\{v_1\} = U$ . Definiere "die Spiegelung  $S_U \in \text{End}(\mathbb{R}^2)$  an  $U$ " durch

$$S_U(v_1) = v_1, S_U(v_2) = -v_2.$$

Dann gilt  $S_U \in O(\mathbb{R}^2) \setminus SO(\mathbb{R}^2)$ , da  $\text{Mat}_{\mathcal{G}}^{\mathcal{G}}(S_U) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in O(2) \setminus SO(2)$ .

$S_U$  ist durch  $U$  eindeutig bestimmt!

(6.21) Fakt. Es gilt:

- (i)  $SO(\mathbb{R}^2) = \{D_\varphi \mid \varphi \in [0, 2\pi)\}$ .
- (ii)  $O(\mathbb{R}^2) = \{S_U \mid U \text{ 1-dimensionaler Unterraum des } \mathbb{R}^2\}$ .
- (iii)  $\forall \varphi, \psi \in \mathbb{R} : D_{\varphi+\psi} = D_\varphi \circ D_\psi (= D_\psi \circ D_\varphi), D_0 = \text{id}_{\mathbb{R}^2}$  (d.h.  $\varphi \in (\mathbb{R}, +) \rightarrow D_\varphi \in (SO(\mathbb{R}^2), \circ)$  ist surjektiver Gruppenhomomorphismus).

$$D_\varphi = \text{id}_{\mathbb{R}^2} \Leftrightarrow \varphi \in \{2\pi k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

- (iv)  $S_{U_2} \circ S_{U_1} = D_{2\varphi}$ , wobei  $\varphi$  der Winkel ist, um den man  $U_1$  drehen muß, um  $U_2$  zu erhalten, d.h.  $D_\varphi(U_1) = U_2$ . ( $\varphi$  ist bis auf additive Vielfache  $\varphi + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ , von  $\pi$  bestimmt.)
- (v)  $D_{2\varphi} \circ S_U = S_{D_\varphi(U)}, S_U \circ D_{2\varphi} = S_{D_{-\varphi}(U)}$ .

Insbesondere folgt aus (iii), (iv) bzw. (v), daß  $SO(\mathbb{R}^2)$  abelsch ist, während  $O(\mathbb{R}^2)$  nicht abelsch ist.

Bew.:

- (i) Sei  $L \in SO(\mathbb{R}^2)$ ,  $L(e_1) =: (x, y) \in \mathbb{R}^2$ . Dann gilt  $x^2 + y^2 = 1$  und mit den Kenntnissen aus der Analysis I kann man einsehen, daß es genau ein  $\varphi \in [0, 2\pi)$  gibt mit  $(x, y) = (\cos \varphi, \sin \varphi)$ , d.h.  $L(e_1) = D_\varphi(e_1)$ . Dann sind  $L(e_2)$  und  $D_\varphi(e_2)$  beide Einheitsvektoren, die zu  $L(e_1) = D_\varphi(e_1)$  orthogonal sind und zusammen mit  $L(e_1) = D_\varphi(e_1)$  eine positiv orientierte Basis bilden. Da es nur einen solchen Vektor gibt (das ist anschaulich klar, muß aber im Prinzip durch eine Rechnung begründet werden), gilt auch  $L(e_2) = D_\varphi(e_2)$ , also  $L = D_\varphi$ .
- (ii) Sei  $L \in O(2) \setminus SO(2)$ . Um zu zeigen, daß  $L$  eine Spiegelung ist, suchen wir einen 1-dimensionalen Unterraum  $U$ , der punktweise von  $L$  festgelassen wird, d.h. einen Vektor  $v \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$  mit  $L(v) = v$  ( $\Leftrightarrow v$  EV zum EW 1 von  $L$ ). Ist  $\text{Mat}(L) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ , so gilt wegen  $\det L = -1$ :  $\det(L - \lambda \text{id}_{\mathbb{R}^2}) = \lambda^2 - (a+d)\lambda - 1 =: p(\lambda)$ .

Wegen  $p(0) = -1$  und  $\lim_{\lambda \rightarrow \pm\infty} p(\lambda) = \infty$ , hat  $p(\lambda)$  zwei Nullstellen (d.h.  $L$  zwei Eigenwerte)  $\lambda_2 < 0 < \lambda_1$ . Da  $L$  orthogonal ist, hat jeder Eigenwert von  $L$  den Betrag 1, also  $\lambda_2 = -1, \lambda_1 = 1$ . Sei  $v_1$  EV von  $L$  zum EW  $\lambda_1 = 1$  und  $(v_1, v_2)$  ONB von  $\mathbb{R}^2$ . Aus  $L \in O(\mathbb{R}^2)$ ,  $L \neq \text{id}_{\mathbb{R}^2}$  und  $L(v_1) = v_1$ , folgt  $L(v_2) = -v_2$ , d.h.  $L = S_U$  für  $U := \text{span}\{v_1\}$ .

(iii) folgt aus den "Additionstheoremen" für sin und cos.

(iv) Es gelte  $D_\varphi(U_1) = U_2$ . Da  $\det(S_{U_2} \circ S_{U_1}) = \det(S_{U_2}) \det(S_{U_1}) = (-1)^2 = 1$  ist, ist  $S_{U_2} \circ S_{U_1} \in SO(\mathbb{R}^2)$ , d.h.  $S_{U_2} \circ S_{U_1}$  ist eine Drehung.

Wie in der Vorlesung mit einem einfachen elementargeometrischen Argument (und ähnlich für (v)) gezeigt wurde, ist  $S_{U_2} \circ S_{U_1}$  in der Tat eine Drehung um den Winkel  $2\varphi$ . Dieses Argument muß aber in der hier aufgebauten "Analytischen Geometrie" durch eine Rechnung bewiesen werden. Es ist nun so, daß solche Rechnungen statt mit  $(2 \times 2)$ -Matrizen sehr viel weniger aufwendig mit komplexen Zahlen ausgeführt werden können. Deshalb zunächst der

### Exkurs: Beschreibung von Drehungen und Spiegelungen des $\mathbb{R}^2$ mit Hilfe der komplexen Zahlen.

Identifizieren wir wie üblich  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  mit  $x + iy \in \mathbb{C}$  und definieren (!) wir für  $\varphi \in \mathbb{R}$

$$e^{i\varphi} := \cos \varphi + i \sin \varphi$$

(für diese Definition gibt es einen mathematischen Hintergrund, der uns jetzt nicht zu interessieren braucht), so berechnet man:

$$D_\varphi(z) = e^{i\varphi} \cdot z.$$

Die Additionstheoreme für sin und cos sind äquivalent zur Gleichung  $e^{i(\varphi+\psi)} = e^{i\varphi} \cdot e^{i\psi}$  für alle  $\varphi, \psi \in \mathbb{R}$ . Außerdem gilt  $\overline{e^{i\varphi}} = e^{-i\varphi}$  und  $|e^{i\varphi}| = \sqrt{\cos^2 + \sin^2} \varphi = 1$ . Ist  $U = \text{span}_{\mathbb{R}}\{e^{i\psi}\} := \{se^{i\psi} \mid s \in \mathbb{R}\}$ , so zeigen wir, daß  $S_U$  durch

$$S_U(z) = e^{2i\psi} \bar{z}$$

gegeben ist: Die Abbildung  $z \in \mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2 \rightarrow \bar{z} \in \mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$  ist gerade die Spiegelung an der  $x$ -Achse, so daß die Abbildung

$$z \rightarrow e^{2i\psi} \bar{z} = D_{2\psi}(\bar{z})$$

in  $O(\mathbb{R}^2) \setminus SO(\mathbb{R}^2)$  liegt. Wendet man sie auf  $z = e^{i\psi}$  an, so erhält man  $e^{i\psi} \rightarrow e^{2i\psi} \cdot e^{-i\psi} = e^{i\psi}$ . Da auch  $S_U(e^{i\psi}) = e^{i\psi}$  gilt, folgt

$$S_U(z) = e^{2i\psi} \bar{z}$$

für alle  $z \in \mathbb{C}$ , denn beide Abbildungen sind Spiegelungen, die die Gerade  $\text{span}_{\mathbb{R}}\{e^{2i\psi}\}$  fest lassen.

Wir kommen nun zu einem "analytischen" Beweis von (6.21)(iv) und (v):

(iv): Es sei  $U_1 = \text{span}_{\mathbb{R}}\{e^{i\psi_1}\} = D_{\psi_1}(\mathbb{R} \times \{0\})$  und  $U_2 = \text{span}_{\mathbb{R}}\{e^{i\psi_2}\} = D_{\psi_2}(\mathbb{R} \times \{0\})$ .

Dann gilt  $D_{\psi_2-\psi_1}(U_1) = D_{\psi_2-\psi_1}(D_{\psi_1}(\mathbb{R} \times \{0\})) \stackrel{\text{(iii)}}{=} D_{\psi_2}(\mathbb{R} \times \{0\}) = U_2$ , d.h. für  $\varphi := \psi_2 - \psi_1$  gilt  $D_\varphi(U_1) = U_2$ . Andererseits berechnen wir für alle  $z \in \mathbb{C}$ :

$$S_{U_2} \circ S_{U_1}(z) = S_{U_2}(e^{2i\psi_1}\bar{z}) = e^{2i\psi_2} \overline{(e^{2i\psi_1}\bar{z})} = e^{i2(\psi_2-\psi_1)}z = D_{2\varphi}(z)$$

(v): Ist  $U = \text{span}_{\mathbb{R}}\{e^{i\psi}\}$ , so gilt

$$D_{2\varphi} \circ S_U(z) = e^{2i\varphi} e^{2i\psi}\bar{z} = e^{2i(\varphi+\psi)}\bar{z} = S_{D_\varphi(U)}(z),$$

da  $D_\varphi(U) = \text{span}_{\mathbb{R}}\{D_\varphi(e^{i\psi})\} = \text{span}_{\mathbb{R}}\{e^{i(\varphi+\psi)}\}$ .

Ebenso erhalten wir:

$$S_U \circ D_{2\varphi}(z) = e^{2i\psi}(e^{-2i\varphi}\bar{z}) = e^{2i(\psi-\varphi)}\bar{z} = S_{D_{-\varphi}(U)}(z).$$

## Normalform von orthogonalen Abbildungen

(6.22) Def.: Sei  $L \in \text{End}(V)$ . Ein Untervektorraum  $U$  von  $V$  heißt  $L$ -invariant, falls  $L(U) \subseteq U$  gilt.

Bem.:  $\{0\}$  und  $V$  sind  $L$ -invariant für jedes  $L \in \text{End}(V)$ .

Ein großes Ziel bei der Untersuchung eines  $L \in \text{End}(V)$  ist es,  $L$ -invariante Unterräume  $U_1 \neq \{0\}, U_2 \neq \{0\}$  zu finden, so daß  $V$  die direkte Summe von  $U_1$  und  $U_2$  ist, d.h.  $V = U_1 \oplus U_2$ . Dann reduziert sich die Untersuchung von  $L$  auf die Untersuchung von  $L|_{U_1} \in \text{End}(U_1)$  und  $L|_{U_2} \in \text{End}(U_2)$ . (Leider ist das nicht immer möglich, z.B. nicht für die "Scherung"

$L \in \text{End}(\mathbb{R}^2)$  mit  $\text{Mat}(L) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ .)

Man wird natürlich versuchen, solche  $L$ -invarianten Unterräume  $U_1$  und  $U_2$  in noch kleinere  $L$ -invariante Unterräume zu zerlegen, und dazu benötigen wir den Begriff der direkten Summe von endlich vielen Unterräumen (vgl. (3.19)–(3.21) und Blatt 3, Aufgabe 4): Sind  $U_1, \dots, U_k$  Unterräume eines Vektorraums  $V$ , so heißt  $V$  die direkte Summe von  $U_1, \dots, U_k$

(geschrieben  $V = U_1 \oplus \dots \oplus U_k = \bigoplus_{i=1}^k U_i$ ), falls gilt:

(i)  $V = \text{span}\left(\bigcup_{i=1}^k U_i\right)$  und

(ii) Für alle  $i \in \{1, \dots, k\}$  gilt:  $U_i \cap \text{span}\left(\bigcup_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^k U_j\right) = \{0\}$ .

Daraus folgt: Ist für  $i = 1, \dots, k$   $B_i$  eine Basis von  $U_i$ , so gilt  $B_i \cap B_j = \emptyset$  für  $i \neq j$ , und  $B := \bigcup_{i=1}^k B_i$  ist Basis von  $V$ . Ist  $\dim V < \infty$ , so folgt:

$$\dim V = \sum_{i=1}^k \dim U_i.$$

Im Fall eines euklidischen Vektorraums  $(V, \langle, \rangle)$  ist folgender Spezialfall der direkten Summe wichtig:

(6.23) Def.: Seien  $U_1, \dots, U_k$  Unterräume von  $V$ . Dann heißt  $V$  die orthogonale Summe von  $U_1, \dots, U_k$ , falls gilt:

- (i)  $V = \text{span}\left(\bigcup_{i=1}^k U_i\right)$  und
- (ii) Für alle  $1 \leq i \neq j \leq k$  gilt  $U_i \subseteq U_j^\perp$ .

Zur Bedingung (ii) sagt man, die  $U_i$ ,  $1 \leq i \leq k$ , seien paarweise orthogonal.

Aus (6.23)(i) und (ii) folgt, daß  $V$  die direkte Summe von  $U_1, \dots, U_k$  ist.

(6.24) Satz. Sei  $L \in O(V)$ . Dann existieren  $k \in \mathbb{N}$ , 2-dimensionale,  $L$ -invariante Unterräume  $U_1, \dots, U_k$  von  $V$  und  $L$ -invariante Unterräume  $U_-$  und  $U_+$  von  $V$ , so daß  $V$  die orthogonale Summe von  $U_1, \dots, U_k, U_-, U_+$  ist und so daß gilt

- (i)  $L|_{U_i} \in SO(U_i) \setminus \{\pm \text{id}_{U_i}\}$  für  $1 \leq i \leq k$
- (ii)  $L|_{U_-} = -(\text{id}_{U_-})$
- (iii)  $L|_{U_+} = \text{id}_{U_+}$

Bem.: 1) Es kann  $k = 0$  oder  $U_- = \{0\}$  oder  $U_+ = \{0\}$  gelten.

2) Jedes  $v \in V$  läßt sich dann eindeutig darstellen als

$$v = u_1 + \dots + u_k + u_- + u_+$$

mit  $u_i \in U_i$  für  $1 \leq i \leq k$ ,  $u_- \in U_-$  und  $u_+ \in U_+$ . Es gilt dann:

$$L(v) = L(u_1) + \dots + L(u_k) - u_- + u_+.$$

$L$  setzt sich also aus  $k$  "Drehungen" in den 2-dimensionalen Unterräumen  $U_i$ ,  $1 \leq i \leq k$ , aus der "Punktspiegelung"  $-(\text{id}_{U_-})$  im Unterraum  $U_-$  und der Identität auf  $U_+$  zusammen.

3) Es gilt  $2k + \dim U_- + \dim U_+ = n$ . Ist  $n$  ungerade, so folgt  $\dim U_- + \dim U_+ \neq 0$ .

4)  $\det(L) = (-1)^{\dim U_-}$ , vgl. Blatt 3, Aufgabe 3.

Umformuliert für Matrizen besagt (6.24):



(ii) Gilt  $U \subsetneq \mathbb{R}^n$ , so folgt aus (6.15)

$$\mathbb{R}^n = U \oplus U^\perp$$

Da  $U$   $L$ -invariant ist und  $L$  orthogonal ist, ist auch  $U^\perp$   $L$ -invariant (vgl. Blatt 1, Aufgabe 1). Wegen  $\dim U^\perp = n - \dim U < n$  ist auf  $L|_{U^\perp}$  die Induktionsvoraussetzung anwendbar. Daraus folgt zusammen mit unseren Kenntnissen über  $O(\mathbb{R})$  und  $O(\mathbb{R}^2)$  die Behauptung.

Die einzige zusätzliche Information, die man zum Beweis von (6.24)' benötigt, ist folgende: Ist  $\dim V = 2$  und  $L \in SO(V) \setminus \{\pm \text{id}_V\}$ , so existiert eine ONB  $\mathcal{G}$  von  $V$  und  $\varphi \in (0, \pi)$ , so daß  $\text{Mat}_{\mathcal{G}}^{\mathcal{G}}(L) = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$  gilt. Das sieht man so ein. Ist  $\tilde{\mathcal{G}} = (v_1, v_2)$  irgendeine ONB von  $V$ , so existiert  $\tilde{\varphi} \in (0, \pi) \cup (\pi, 2\pi)$  mit

$$\text{Mat}_{\tilde{\mathcal{G}}}^{\tilde{\mathcal{G}}}(L) = \begin{pmatrix} \cos \tilde{\varphi} & -\sin \tilde{\varphi} \\ \sin \tilde{\varphi} & \cos \tilde{\varphi} \end{pmatrix}$$

Ist  $\tilde{\varphi} \in (\pi, 2\pi)$ , so betrachten wir  $\mathcal{G} = (v_1, -v_2)$  und erhalten

$$\text{Mat}_{\mathcal{G}}^{\mathcal{G}}(L) = \begin{pmatrix} \cos \tilde{\varphi} & \sin \tilde{\varphi} \\ -\sin \tilde{\varphi} & \cos \tilde{\varphi} \end{pmatrix}$$

Wegen  $\cos(-\tilde{\varphi}) = \cos \tilde{\varphi}$ ,  $\sin(-\tilde{\varphi}) = -\sin \tilde{\varphi}$  folgt mit  $\varphi := 2\pi - \tilde{\varphi} \in (0, \pi)$ :

$$\text{Mat}_{\mathcal{G}}^{\mathcal{G}}(L) = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

wie behauptet.

Die anschauliche Begründung für die letzte Überlegung ist wie folgt: Ist  $\dim V = 2$  und  $L \in SO(V)$ , so ist der "Drehwinkel"  $\tilde{\varphi}$  von  $L$  erst nach Wahl einer Orientierung ( $\Rightarrow$  eines "positiven Drehsinns") für  $V$  definiert. Ändert man die Orientierung, so geht  $\tilde{\varphi}$  in  $-\tilde{\varphi}$  über. Ist  $\tilde{\varphi} \in (\pi, 2\pi)$ , so ist  $-\tilde{\varphi} \in (-2\pi, -\pi)$  und statt  $-\tilde{\varphi}$  kann man natürlich auch  $\varphi := 2\pi - \tilde{\varphi} \in (0, \pi)$  nehmen.

Oft ist es wichtig zu wissen, ob die Unterräume in (6.24) und ob die Normalform in (6.24)' und die zugehörige ONB eindeutig durch  $L$  bestimmt sind.

Hierzu kann man folgendes sagen:

Es gilt  $U_+ = \ker(L - \text{id}_V)$ ,  $U_- = \ker(L + \text{id}_V)$ , so daß  $U_-, U_+$  und damit auch  $k = \frac{1}{2}(n - (\dim U_- + \dim U_+))$  eindeutig durch  $L$  bestimmt sind. Die  $\varphi_1, \dots, \varphi_k \in (0, \pi)$  sind (bis auf ihre Reihenfolge) eindeutig durch  $L$  bestimmt (und damit auch die Normalform in (6.24)'), da  $e^{i\varphi_1}, e^{-i\varphi_1}, \dots, e^{i\varphi_k}, e^{-i\varphi_k}$  gerade die Eigenwerte  $\neq \pm 1$  von  $\tilde{L}$  sind. Aus (6.24)' folgt nämlich sofort:

$$\det(L - \lambda \text{id}) = \prod_{j=1}^k \underbrace{(\lambda^2 - 2(\cos \varphi_j)\lambda + 1)}_{(\lambda - e^{i\varphi_j})(\lambda - e^{-i\varphi_j})} \cdot (1 + \lambda)^{\dim U_-} \cdot (1 - \lambda)^{\dim U_+}$$

Eine ONB, in der die Matrix von  $L$  die Normalform (6.24)' annimmt, ist nicht eindeutig durch  $L$  bestimmt. Z.B. ist die Matrix einer Drehung,  $D_\varphi \in SO(\mathbb{R}^2)$ ,  $\varphi \in (0, \pi)$ , bezüglich jeder positiv orientierten ONB des  $\mathbb{R}^2$  in der Normalform  $\begin{pmatrix} \cos \varphi_1 & -\sin \varphi_1 \\ \sin \varphi_1 & \cos \varphi_1 \end{pmatrix}$ .

Nach so vielen Worten möchte man hoffen, nun alles über orthogonale Abbildungen zu wissen. Weit gefehlt! Über die Gruppenstruktur von  $SO(n)$  für  $n \geq 3$  wurde etwa noch nichts gesagt. Man möchte auch gern die Elemente von  $SO(3)$  durch 3 (warum gerade 3?) reelle "Parameter" beschreiben (so wie wir die Elemente von  $SO(2)$  durch den Drehwinkel  $\varphi \bmod 2\pi$  beschrieben haben). Aber geht das und wie am besten? Da gibt es Fragen und Antworten, genug für ein ganzes Mathematikstudium...