

# 11. ÜBUNGSBLATT ZUR VORLESUNG LINEARE ALGEBRA I

IM WS 2003/2004 BEI PROF. DR. S. GOETTE

Abgabe Donnerstag, den 22.01.04  
vor der Vorlesung

Bitte schreiben Sie Ihren Namen und die  
Nummer Ihrer Übungsgruppe auf Ihr Blatt

- 1** Eine Basis  $(v_1, v_2, v_3)$  des  $\mathbb{R}^3$ , eine Basis  $(w_1, w_2)$  des  $\mathbb{R}^2$  und zwei Matrizen  $A, B \in M_{2,3}(\mathbb{R})$  seien gegeben durch

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, w_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}, w_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- a) Sei  $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  die lineare Abbildung, die bzgl. der Standardbasen durch  $A$  beschrieben wird. Bestimmen Sie die Matrix von  $F$  bzgl. der Basen  $(v_1, v_2, v_3)$  und  $(w_1, w_2)$ .
- b) Die Abbildung  $G : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  habe bzgl. der Basen  $(v_1, v_2, v_3)$  und  $(w_1, w_2)$  die Matrix  $B$ . Welche Matrix hat  $G$  bzgl. der Standardbasen?

- 2** Berechnen Sie die Determinante der rationalen Matrix  $\begin{pmatrix} 3 & -7 & 0 & 2 \\ -2 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ -3 & 8 & 2 & 9 \end{pmatrix}$ .

- 3** Sei  $n \in \mathbb{N}$ . Für  $i, j \leq n$  mit  $i \neq j$  ist die Transposition  $\tau_{i,j} \in S(n)$  die Permutation mit

$$\tau_{i,j}(k) = \begin{cases} j & \text{für } k = i, \\ i & \text{für } k = j, \\ k & \text{sonst.} \end{cases}$$

Beweisen Sie:

- a) Jede Permutation  $\sigma \in S(n)$  lässt sich für ein geeignetes  $l$  als Produkt  $\sigma = \text{id} \cdot \sigma_1 \cdot \sigma_2 \cdots \sigma_l$  schreiben, wobei jedes der  $\sigma_i$  eine Transposition ist.
- b) Zu jedem  $\sigma \in S(n)$  lässt sich eine Produktdarstellung wie in a) finden, bei der jedes  $\sigma_i$  eine Transposition  $\tau_{k_i, k_i+1}$  benachbarter Elemente ist.
- c) Für das Signum von  $\sigma \in S(n)$  gilt  $\text{sign}(\sigma) = (-1)^{\#\{(i,j) \in \{1, \dots, n\}^2 \mid i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}}$ .

BITTE WENDEN!

- 4** a) Sei  $K$  ein Körper und seien  $x_0, \dots, x_n \in K$ . Als Vandermonde-Matrix bezeichnen wir die Matrix

$$V = \begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ & & \vdots & & \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{pmatrix} \in M_{n+1}(K).$$

Zeigen Sie  $\det V = \prod_{i < j} (x_j - x_i)$ .

Hinweis: Sie können die Matrix durch Zeilen- oder Spaltenumformungen so verändern, dass sich ihre Determinante mit Hilfe der Determinante einer kleineren Vandermonde-Matrix berechnen lässt. Das führt also auf einen Beweis durch vollständige Induktion über  $n$ .

- b) Sei  $n \in \mathbb{N}_0$  und  $K$  ein Körper mit mehr als  $n$  Elementen. Beweisen Sie, dass die  $n + 1$  Funktionen  $K \rightarrow K$ ,  $x \mapsto x^k$  für  $k = 0, \dots, n$  linear unabhängig sind.