

**Aufgabe 1** (4 Punkte)

- (a) Sei  $p \in \mathbb{C}$  ein einfacher Pol von  $f$  und  $\gamma_r(t) = p + re^{it}$ ,  $t \in [0, \pi]$ . Beweisen Sie die Aussage

$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_{\gamma_r} f(z) = \pi i \operatorname{Res}_p f(z),$$

die wir im Beweis von (6.24) Lemma verwendet haben.

- (b) Zeigen Sie:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \pi.$$

*Hinweise: Verwenden Sie das (6.24) Lemma.*

**Aufgabe 2** (4 Punkte)

Sei  $p$  eine Polstelle der Ordnung  $k \in \mathbb{N}$  mit  $k \leq m \in \mathbb{N}$  von  $f$ , und sei  $g$  die holomorphe Fortsetzung von  $(z - p)^m f(z)$  nach  $p$ . Zeigen Sie:

$$\operatorname{Res}_p f(z) = \frac{1}{(m-1)!} g^{(m-1)}(p).$$

**Aufgabe 3** (4 Punkte)

- (a) Berechnen Sie die Integrale

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{iax}}{x - ib} dx \quad \text{und} \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{iax}}{x + ib} dx$$

wobei  $a > 0$  und  $b \in \mathbb{C}$  mit  $\operatorname{Im} b > 0$ .

- (b) Zeigen Sie die Formeln von Laplace:

$$\int_0^{\infty} \frac{b \cos(ax)}{x^2 + b^2} dx = \int_0^{\infty} \frac{x \sin(ax)}{x^2 + b^2} dx = \frac{1}{2} \pi e^{-ab}$$

für  $a, b > 0$ .

*Abgabe bis Mittwoch, 18. Januar, 16 Uhr, in dem dafür vorgesehenen Briefkasten im Mathematischen Institut.*