

Übungsblatt 14

Thetareihen und Thetakonstanten

53. Eisensteinreihen und Jacobi-Thetakonstanten

(4 Punkte) Drücken Sie die Eisensteinreihen E_4 und E_6 als Polynome in den Jacobi-Thetakonstanten θ_2, θ_3 und θ_4 aus.

54. Die elliptische Kurve in Hesse-Form und Torsionspunkte

Zeigen Sie, dass die elliptische Kurve aus Aufgabe 25 folgende Eigenschaften besitzt:

(a) (1 Punkt) Der Parameter a ist gleich der folgenden Funktion in τ :

$$a(\tau) = \frac{\vartheta_{00}(0, 3\tau)^3 + q^{\frac{1}{2}}\vartheta_{00}(\tau, 3\tau)^3 + q^2\vartheta_{00}(2\tau, 3\tau)^3}{3q^{\frac{5}{6}}\vartheta_{00}(0, 3\tau)\vartheta_{00}(\tau, 3\tau)\vartheta_{00}(2\tau, 3\tau)}$$

(b) (2 Punkte) Das Bild eines 3-Torsionspunktes von $E_\tau = \mathbb{C}/\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau$ unter der Abbildung $\phi_3: E_\tau \rightarrow \mathbb{CP}^2$ ist ein Wendepunkt. Bestimmen Sie die projektiven Koordinaten dieser Punkte.

(c) (1 Punkt) Das Bild eines 2-Torsionspunktes der Kubik besteht aus den 4 Punkten $[0 : 1 : -1], [1 : \alpha : \alpha]$, wobei α eine Lösung der kubischen Gleichung $2t^3 - 3at^2 + 1 = 0$ ist.

55. Thetareihen für Gitter

Eine reelle symmetrische Matrix S vom Rang n heisst positiv, falls für $x \neq 0, x \in \mathbb{R}^n$ gilt, dass $x^T S x > 0$. Eine reelle symmetrische Matrix S vom Rang n heisst ganz, falls für $x \in \mathbb{Z}^n$ gilt, dass $x^T S x \in \mathbb{Z}$, und heisst gerade, falls $x^T S x \in 2\mathbb{Z}$. Eine invertierbare Matrix U heisst unimodular, falls sowohl U als auch U^{-1} ganzzahlig sind. Jeder positiven Matrix S kann eine Thetareihe zugeordnet werden, $\Theta_S(\tau) = \sum_{x \in \mathbb{Z}^n} \exp(i\pi x^T S x \tau)$. Falls S gerade ist, dann hat $\Theta_S(\tau)$ Periode 2 und eine Fourier-Entwicklung der Form $\Theta_S(\tau) = \sum_{m=0} A_S(m) \exp(i\pi m \tau)$. Dabei bezeichnet $A_S(m) = |\{x \in \mathbb{Z}^n | x^T S x = m\}|$ die Anzahl der Darstellungen einer natürlichen Zahl m durch die quadratische Form S .

(a) (2 Punkte) Es sei S eine positive Matrix vom Rang n . Zeigen Sie, dass gilt:

$$\sqrt{\frac{\tau}{i}} \sqrt{\det S} \sum_{x \in \mathbb{Z}^n} \exp(i\pi(x+w)^T S(x+w)\tau) = \sum_{x \in \mathbb{Z}^n} \exp(i\pi(x^T S^{-1}x(-\frac{1}{\tau}) + 2x^T w))$$

(b) (1 Punkt) Es sei S eine positive und unimodulare Matrix vom Rang n . Zeigen Sie, dass gilt $\Theta_S(-\frac{1}{\tau}) = \sqrt{\frac{\tau}{i}} \sqrt{\det S} \Theta_S(\tau)$.

(c) (1 Punkt) Es sei S eine positive gerade und unimodulare Matrix vom Rang $n \in 8\mathbb{N}$. Dann ist $\Theta_S(\tau) \in M_{\frac{n}{2}}(\Gamma_1)$.

56. Jacobis Formel für die Anzahl Darstellungen einer natürlichen Zahl als Summe von vier Quadraten.

Es sei $\Gamma_\vartheta = \langle \pm S, T^2 \rangle$ die Hecke-Gruppe oder Thetagruppe aus den Aufgaben 16 und 17.

(a) (2 Punkte) Zeigen Sie, dass $4E_2(2\tau) - E_2(\tau/2) \in M_2(\Gamma_\vartheta, \chi)$ mit $\chi(T^2) = 1$, $\chi(S) = -1$ und bestimmen Sie ihre Werte an den Spitzen.

(b) (1 Punkt) Zeigen Sie, dass $\vartheta^4(\tau) = \frac{1}{3}(E_2(2\tau) - E_2(\tau/2))$ gilt.

(c) (1 Punkt) Zeigen Sie, dass für $n \in \mathbb{N}$ gilt:

$$A_4(n) = |\{x \in \mathbb{Z}^4 \mid x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = n\}| = 8 \sum_{\substack{4 \nmid d \mid n \\ 1 \leq d \leq n}} d.$$

Verwenden Sie dazu Aufgabe 55 mit einer geeigneten Matrix S .

Abgabetermin: Freitag, 12.2.2013 um 10:00 Uhr.