

Übungen zur Funktionalanalysis Serie 8 vom 15.04.2015

Für eine kontinuierliche Verbesserung der Vorlesung haben Sie hier die Möglichkeit einer Meinungsabgabe

	1	2	3	4	5
Diese Übung ist zu leicht (1), zu schwierig (5)	<input type="checkbox"/>				
Diese Übung ist langweilig (1), interessant (5)	<input type="checkbox"/>				
Die letzte Vorlesung war unverständlich (1), verständlich (5)	<input type="checkbox"/>				
Die letzte Vorlesung war langweilig (1), interessant (5)	<input type="checkbox"/>				
Kommentare zur Verbesserung:					

Aufgabe 28 Sei $X = \ell^2(\mathbb{N})$. Zeigen Sie, dass für die Folge $(e_i)_{i=1}^\infty \subset \ell^2(\mathbb{N})$ gegeben durch

$$e_i = (0, \dots, 0, \underbrace{1}_{i\text{-te position}}, 0, \dots)$$

gilt

(i) $\|e_i\|_{\ell^2(\mathbb{N})} = 1$ für alle i

(ii) $e_i \xrightarrow{i \rightarrow \infty} 0$ schwach in $\ell^2(\mathbb{N})$.

Hinweis: Benutzen Sie, dass mit dem Darstellungssatz von Riesz für jedes $l \in (\ell^2(\mathbb{N}))^*$ ein $(l_k)_{k=1}^\infty \in \ell^2(\mathbb{N})$ existiert, so dass

$$l(v) = \sum_{k=1}^{\infty} l_k v_k \quad \forall (v_k)_{k=1}^\infty \in \ell^2(\mathbb{N}).$$

(iii) Es existiert kein $b \in \ell^2(\mathbb{N})$ so dass $e_i \xrightarrow{i \rightarrow \infty} b$ stark in $\ell^2(\mathbb{N})$

Aufgabe 29 Sei X ein normierter Vektorraum, und $X^{**} = (X^*)^*$ der zugehörige Bidualraum. Zeigen Sie Satz 6.3 aus der Vorlesung: Die *kanonische Einbettung* $\mathcal{J} : X \rightarrow X^{**}$ ist gegeben durch

$$\mathcal{J} : x \mapsto x^{**},$$

wobei

$$x^{**}(l) := l(x) \quad \forall l \in X^*.$$

Zeigen Sie, \mathcal{J} ist eine lineare Isometrie, d.h. \mathcal{J} ist linear und es gilt

$$\|\mathcal{J}x\|_{X^{**}} = \|x\|_X.$$

Hinweis: Sie können ein ähnliches Argument wie im Beweis zu Satz 5.13 verwenden.

Aufgabe 30 Sei $(X, \|\cdot\|_X)$ ein normierter Vektorraum.

- (i) (Satz 6.7 (i)) Falls X reflexiv ist, so ist auch X^* reflexiv.
- (ii) (Satz 6.9 (ii)) Falls X reflexiv und separabel, dann ist X^* separabel
(Hinweis: Verwenden Sie Satz 6.9 (i): Ist X^* separabel, dann ist auch X separabel).
- (iii) Sei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein Skalarprodukt auf X und sei X vollständig. Angenommen es gilt für ein $C > 0$

$$C^{-1}\langle x, x \rangle \leq \|x\|_X^2 \leq C \langle x, x \rangle \quad \forall x \in X,$$

Dann ist X reflexiv.

***Aufgabe 31** Sei X ein normierter Vektorraum. Zeigen Sie Satz 5.15 aus der Vorlesung. Gehen Sie wie folgt vor:

- (i) Sei $C \subset X$ konvex und offen mit $0 \in C$, und $x_0 \in X \setminus C$. Zeigen Sie: es existiert ein $l \in X^*$ mit

$$l(c) < l(x_0) \quad \forall c \in C.$$

Dazu gehen Sie wie folgt vor: Das Minkowski-Funktional $p : X \rightarrow \mathbb{R}$ ist gegeben durch

$$p(x) := \inf\{\lambda > 0 : x \in \lambda C\}.$$

Dabei ist

$$\lambda C := \{y \in X : y = \lambda c \text{ für ein } c \in C\}$$

- a) p ist sublinear.
 - b) Es existiert ein $R > 0$ so dass $B_R(0) \subset C$, und es gilt dann, dass $p(x) \leq 2R^{-1} \|x\|$ für alle $x \in X$.
 - c) $C = \{x \in X : p(x) < 1\}$, insbesondere gilt $p(x_0) \geq 1$.
 - d) Setzen Sie $f : \text{span}\{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$ als $f(tx_0) := t$, und zeigen Sie, dass $f(x) \leq p(x)$ für alle $x \in \text{span}\{x_0\}$, und f ist linear und stetig auf $\text{span}\{x_0\}$.
 - e) Setzen Sie f fort auf X , d.h. finden Sie $l \in X^*$ so dass $l(c) < 1$ für alle $c \in C$ und $l(x_0) = 1$.
- (ii) Schließen Sie aus (i): Sei $A, B \subset X$ konvex, nichtleer, und disjunkt. Falls A offen ist, dann gibt es ein $l \in X^*$, $\lambda \in \mathbb{R}$ mit

$$l(a) < \lambda \leq l(b) \quad \forall a \in A, b \in B.$$

- (iii) Malen Sie ein Bild der Situation von (ii) in \mathbb{R}^2 : Für zwei disjunkte, konvexe, nichtleere und offene Mengen A und B in \mathbb{R}^2 zeichnen Sie A und B . Zeichnen Sie für ein geeignetes l und λ wie in (ii) die Menge $\{x \in \mathbb{R}^2 : l(x) = \lambda\}$
-