

Übungsblatt 3

- Aufgabe 7** (2+1+2). (i) Sei $\Omega = \mathbb{Q} \cap [0, 1] \subset Q = [0, 1]$. Zeigen Sie, dass 1_Ω nicht integrierbar ist.
- (ii) Sei $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ beschränkt, so dass 1_Ω integrierbar ist und $\text{vol } \Omega = 0$. Sei $A \subset \Omega$. Zeigen Sie, dass dann auch 1_A integrierbar ist und $\text{vol } A = 0$ gilt.
- (iii) Sei $\Omega \subset [0, 1]^2 \subset \mathbb{R}^2$ das rechtwinklige, gleichschenklige Dreieck mit Kantenlänge 1, so dass die beiden Katheten jeweils auf der x - bzw. y -Achse liegen. Bestimmen Sie $S_k(1_\Omega)$ und $S^k(1_\Omega)$ und damit dann (unter Verwendung der Definition der Integrierbarkeit) $\int_{[0,1]^2} 1_\Omega d\text{vol}$.

- Aufgabe 8** (1+2+2). (i) Berechnen Sie $\int_{[0,\pi] \times [-\frac{\pi}{2}, \pi]} \sin(x+y) d\text{vol}$.
- (ii) Bestimmen und skizzieren Sie $\Omega \subset [0, a] \times [0, a] \subset \mathbb{R}^2$, $a > 1$, so dass 1_Ω integrierbar ist (begründen Sie dann auch, warum es integrierbar ist) und das Anwenden von Fubini

$$\int_{\Omega} d\text{vol} = \int_0^a \left(\int_0^x dy \right) dx$$

ergibt. Wenden Sie auf dieses Ω Fubini mit vertauschter Integrationsreihenfolge an und bestimmen Sie damit die Integrationsgrenzen in

$$\int_{\Omega} d\text{vol} = \int_?^? \left(\int_?^? dx \right) dy.$$

- (iii) Lösen Sie (ii) noch einmal für


$$\int_{\Omega} d\text{vol} = \int_0^a \left(\int_{a-x}^{a^2-x^2} dy \right) dx$$

mit $\Omega \subset [0, a] \times [0, a^2]$ für $a > 1$.

- Aufgabe 9** (2.5+2.5). (Prinzip des Cavalieri)

- (i) Seien $\Omega_i \subset \mathbb{R}^n$, $i = 1, 2$, beschränkt und so dass $1_{\Omega_i} \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ integrierbar sind. Für $h \in \mathbb{R}$ fassen wir $\Omega_{i,h} := \Omega_i \cap \{x_n = h\} \subset \mathbb{R}^{n-1} \times \{x_n = h\} \cong \mathbb{R}^{n-1}$ als Teilmenge von \mathbb{R}^{n-1} . Sei nun für alle $h \in \mathbb{R}$ die Funktion $1_{\Omega_{i,h}} : \mathbb{R}^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}$ integrierbar. Sei $\text{vol}_{n-1} \Omega_{i,h} := \int_{\mathbb{R}^{n-1}} 1_{\Omega_{i,h}} d\text{vol}$ (vgl. Bemerkung 1.2.4). Sei $\text{vol}_{n-1} \Omega_{1,h} = \text{vol}_{n-1} \Omega_{2,h}$ für alle $h \in \mathbb{R}$. Zeigen Sie, dass dann $\text{vol } \Omega_1 = \text{vol } \Omega_2$ gilt.
- (ii) (Serviettenring-Problem)

Sie haben eine Kugel von Radius r und stechen mittels eines Zylinders, dessen Achse durch den Mittelpunkt der Kugel geht, ein Teil der Kugel aus. Dann bleibt (wenn der Radius des Zylinders kleiner r war) ein Rest übrig. Dieser Rest habe Höhe h . Zeigen Sie, dass das Volumen dieses Restes nicht vom Radius der ursprünglichen Kugel abhängt.



Abgabe am Dienstag 15.11.22 bis 18 Uhr